

Sur l'anéurisme.

nous avons vus à l'academie deux anéurismes
de l'artere aorte, montrés l'un par m. Duvernoy
neveu du celebre anatomiste l'autre par m. Jager
chirurgien de l'hopital de la Salpêtrière.


Dans le premier, les tuniques étoient ossifiées en différents endroits, et
des concrétions s'étoient formées dans l'intérieur du vaisseau ^{en} diminuant
la ~~capacité~~ ^{conservation} ~~conservation~~ ^{conservation} qu'il avoit acquise
par la dilatation, dans le second, l'artere étoit d'abord
en forme d'anneau meure s'étoit ouverte dans une poche
faite des tuniques de la même artere dilaté, ce qui faisoit
paraître un anéurisme faux enné, pourrai-je dire sur un
vray.

Observation

par m. Duvernoy

A.







M^r Duvernoy

Observation

4^e à imprimer sur deux anévrismes de l'aorte qui renferment
plusieurs singularités découvertes par l'ouverture
d'un cadavre

A

au mois de decembre mil sept cent trente un —
je fut mandé dans la grande rue d'antoinne
aux M. M. granier, d'albon et talin mes —
confreres, et monsieur Bonvday chirurgien
privilegié pour faire l'ouverture du cadavre
^{d'un homme}
du sieur igou elissette qui étoit mort subitement.
à l'occasion d'une tumeur anévrismale, qui —
luy étoit survenue au mois de juin mil
sept cent trente. apres un effort qu'il fit —
en levant un fardeau tres pesant.

Cette tumeur avoit été précédée de douleurs —
tres vives et de battemens frequens qui s'étoient
fait ressentir dans la partie supérieure de la —
poitrine; et de tant en suite accrûe pû à pû —
malgré les soins qu'on apportoit pour en arrester

ARC 54 n° 61



Le progrès, tant par les saignées, le régime
et le bandage que par le repos qui fut
recommandé au ^{malade} sujet, elle étoit enfin parvenue
dans les derniers tems à ^{un tel volume qu'elle occupoit} occuper latéralement
une grande partie du côté gauche de la poitrine
et formoit environ un ponce de saillie en dehors,
Les tegumens avoient néanmoins conservé
leur couleur naturelle; ce qu'il y a surtout
à remarquer c'est que la pulsation qui
avoit été très sensible dans les commencemens,
disparut tout à fait dès que la tumeur eut
acquis un volume considérable. le ^{malade} sujet
pour lors fut assujéti à porter un bandage
concaue que monsieur Bourdan son chirurgien
ordinaire lui fit faire pour loger la
tumeur et la défendre des injures latérales;

Dans ces circonstances le fruit qui nous
nous proposames de tirer de l'ouverture du cadavre

fut de découvrir l'artère qui formoit
l'anévrisme, qui ne paroissoit être indiqué
que par le volume énorme de la tumeur; et
en même tems de reconnaître ce qui auroit
donné lieu aux variations qu'on avoit
remarquées dans les différents états de
cette tumeur ^{quand} ~~quand~~ ^{quant} à la pulsation.

on leva premièrement les tegumens et
ensuite les muscles pectoraux pour découvrir
la tumeur: les muscles se trouverent éminés —
considérablement en sorte que le petit pectoral
n'étoit plus pour ainsi dire que membraneux.
La tumeur que formoit le sac anévrisimal
étoit affaiblie en quelques endroits. et après
l'avoir ouverte j'en tiray plusieurs gros caillots —
de sang d'une consistance polipeuse qui étoient
attachés à la surface interne du sac par



plusieurs lames ou couches arrangées —
différemment les unes sur les autres. ce
sac pouvoit contenir environ une chopine
de liqueur et s'enfonçoit dans la poitrine entre
la première et troisième des brayes cottes
la deuxième le trouvant entièrement détruite
dans l'endroit où le sac étoit pratiqué un
passage. la troisième cote étoit entièrement
cariée dans presque toute sa longueur aussi —
bien que le premier os du sternum ^{qui} qui
étoit intérieurement et qui outre cela étoit
déjeté en devant. j'en levay le sternum en
tiers pour suivre le sac aneurismal
jusqu'à son origine. dans le même
temps il sortit une grande quantité d'eau de
~~qui inondoit~~ la cavité gauche de la poitrine,
et j'appreueus une masse considérable de
sang coagulé qui nous parut avoir été

la cause de la mort du sujet, et qui avoit
été formé par une ouverture qui se remarqua
à la partie postérieure du sac aneurismal; cette
ouverture avoit été occasionnée selon toute
apparence par la présence du sang même
ou par quelques mouvements violents du ^{malade} sujet
joint ^{à la peu d'épaisseur} à la faille du sac qui se trouvoit
extrêmement dilaté, et qui formoit dans la
poitrine une poche très basse adhérente aux
quatre premières vraies côtes et à la partie
postérieure du lobe gauche du poulmon, je
détachai cette poche de toutes ses adhérences,
j'écartai ensuite le poulmon, et au moyen de
cela je découvris un autre sac aneurismal
d'une figure ovale, qui avoit quatre paies
de longueur et sept de circonférence, qui



commençait à la naissance de l'aorte, se tendait
jusqu'à la sonde gauche, et communiquait
avec le grand sac par trois ouvertures distinctes
qui avoient chacune sept à huit lignes de
diamètre, et qui paroissent d'autant moins
récentes que les sondechures en étoient presque
cartilagineuses. Ce second sac différoit du
premier en ce qu'il étoit produit de l'aorte
même, qu'il en étoit proprement une
dilatation, et qu'il formoit en conséquence
un aneurisme vrai, l'autre au contraire
n'étoit qu'une ^{expansion} ~~expansion~~ de la tunique
interne de l'aorte fortifié par la membrane
des poulmons, et par la plèvre, et ne pouvoit
être regardé que comme un aneurisme faux,
qui se trouvoit enté, pour ainsi dire

Sur Le Cray.

Le péricarde le cœur, et Les poumons malgré
tout ce désordre furent trouvés dans leur état
naturel: mais ce qui paroit surtout de plus
surprenant et qu'aucun auteur que je sache
n'a encore observé c'est la rupture qui s'étoit
faite en trois endroits différents de l'aorte sus-
citer la mort sur le champ et sans que les parties
de la destination de cette artère fussent privées
du sang qui leur étoit nécessaire par le panchement
qui s'en faisoit dans le grand sac anévrisimal
indépendamment de cela il faut observer que si
l'anévrisme faux se trouvoit marqué de façon
que si l'on n'eût été bien et suivi exactement dès
la naissance, on auroit pu facilement le
confondre avec une autre maladie non seulement



par rapport à la situation et au volume
~~extraordinaire de la tumeur, mais aussi par rapport~~
~~à la mole, et à la fluctuation qu'on y sentoit~~
~~de même que dans un abcès, la pulsation~~
~~d'ailleurs s'y trouvant interceptée par le~~
~~sang coagulé qui remplissoit une grande~~
~~partie du sac aneurismal.~~

Ces circonstances sont d'autant plus importantes
à rappeler ici qu'elles peuvent se rencontrer
dans d'autres aneurismes et engager le
chirurgien dans une faute irréparable
en lui faisant prendre le parti de l'ouverture
sous les apparences trompeuses qu'elles
présentent d'une tumeur ordinaire,

D'ailleurs, la fluctuation est molle et qu'on sentroit la tumeur
exister, comme dans un abcès ordinaire, et sans pulsation. Cette
circonstance pouvant se rencontrer dans d'autres aneurismes, est
importante à observer car elle pourroit faire prendre le parti d'ouvrir
un aneurisme sous les apparences trompeuses d'un abcès ordinaire.

La premiere figure represente la tumeur
ouverte A. l'ouverture et son étendue B. les
tegumens, les pectoraux et la surface du —
sac l'artère renversée D, les sutures —
de la deuxième cote dont le reste étoit détruit
et carie E.

La deuxième figure represente le cœur avec
le sac aneurismal F. la veine cave descendante
G. le sac aneurismal H H. les trois trons —
qui communiquent dans le sac aneurismal I.
La naissance de l'aorte descendante L. la —
trachée artère M. la sonde aërienne et les deux —
carotides N. le cœur O. la portion du sac —
aneurismal renfermé dans la poitrine P. —

B.

Observation

parm. fages
Chirurgien de la
Salpêtrière



...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...